



داروهای مصرفی در بیماران دیالیزی

تهیه کننده: واحد آموزش سلامت

تایید کننده: کمیته آموزش بیمار

تاریخ بازنگری: پاییز ۱۴۰۲

منابع: ClinicalKey, WebMD, Mayo clinic

“ارتباط با ما”

تلفن تماس:

۰۳۵۳-۳۱۲۲۲۳۰

اینها:

۰۹۹۶۵۲۵۰۰۶۹

آدرس اینترنتی:

rahnemoon.ssu.ac.ir

❖ شرح

کلیه‌ها وظایف متعددی در بدن به عهده دارند که سه وظیفه اصلی آنها عبارت است از:

- ✓ **دفع مواد زائد خون:** از سوخت و ساز مواد در بدن یک سری مواد زائد مانند: اوره، کراتینین و اسید اوریک تولید می‌شود که کلیه‌ها با تولید و ترشح ادرار این مواد را دفع می‌کند.
- ✓ **تنظیم آب بدن:** کلیه‌ها با کم و زیاد کردن حجم ادرار، آب بدن را تنظیم می‌کنند.

✓ **تولید بعضی از هورمون‌ها:** مهمترین کاری که این هورمون‌ها در بدن انجام می‌دهند شامل موارد زیر است:

- تنظیم فشار خون
- کمک به تولید گلبول‌های قرمز خون
- کمک به استحکام استخوان‌ها

اگر به علتی کلیه آسیب ببیند نمی‌تواند وظایف اصلی خود را بدرستی انجام دهد و مشکلاتی برای بیمار ایجاد می‌نماید. به طور مثال اگر نتواند هورمون تحریک کننده مغز استخوان بسازد موجب کاهش گلبول‌ها و کم خونی می‌گردد.

❖ اپرکس یا اریتروپویتین

اریتروپویتین پروتئینی است که در کلیه‌ها برای تحریک مغز استخوان جهت ساختن گلبول‌های قرمز تولید می‌شود. آنمی یا کم خونی به حالتی گفته می‌شود که گلبول‌های قرمز مقدار کافی در بدن تولید نشده و موجب خستگی وضع می‌گردد. در بیماران دچار نارسایی مزمن کلیه تولید اریتروپویتین توسط کلیه‌ها به قدری کم می‌شود که دیگر مغز استخوان قادر به تولید گلبول قرمز نمی‌باشد در نتیجه آنمی ایجاد می‌گردد. با تزریق داروی اپرکس تولید گلبول قرمز در بدن افزایش یافته و کم خونی ایجاد نمی‌گردد. در نتیجه حالاتی مانند ضعف، خستگی و بی حالی در بدن از بین رفته و کارکرد قلب نیز بسیار بهتر می‌شود. نگهداری و مراقبت خاص از این دارو توسط استفاده کنندگان الزامیست. موارد زیر را بخاطر بسپارید:

- ✓ مواردی چون تغییر شدید دما، مجاورت طولانی با نور، تکان‌های شدید ویال و سرنگ محتوی دارو از مواردی است که بر عملکرد دارو اثر می‌گذارند.
- ✓ پس از خرید دارو از قرار دادن آن در مجاورت نور خورشید مقابل پنجره یا شیشه اتومبیل خوداری نمایید.
- ✓ از قرار دادن دارو در فریزر جدا خوداری نمایید.
- ✓ دارو را همواره از مجاورت نور و منابع گرمایی دور نگه دارید.
- ✓ تازمانی که از دارو استفاده نکرده اید آن را در یخچال درون جعبه مقوایی خود نگه دارید.
- ✓ جهت تاثیر بهتر دارو، قرص B ب کمپکس و اسید فولیک را روزانه مصرف نمایید.
- ✓ از حمل دارو در اتومبیلی که دمای داخل آن بیش از ۲۵ درجه سانتی گراد باشد خودداری نمایید.
- ✓ از تکان دادن شدید آمپول یا شیشه دارو حتی هنگامی که دارو در جعبه خود قرار دارد، جدا خوداری نمایید.
- ✓ سریعاً دارو را در یخچال با دمای ۲-۸ درجه سانتی گراد در قفسه‌ای موجود در درب آن قرار دهید.
- ✓ بدانید که یکی از عوارض مهم داروی اریتروپویتین افزایش فشار خون است لذا مراقب فشار خون خود باشید و مرتب از نظر فشار خون کنترل شوید.
- ✓ با درمان کم خونی و بهتر شدن اشتهای مراقب افزایش وزن خشک و افزایش سموم مانند اوره و پتاسیم باشید.
- ✓ ممکن است در حین درمان با اریتروپویتین نیاز به هپارین بیشتری ضمن دیالیز داشته باشید لذا فیستول خود را کنترل نمایید و هرگونه تغییر را گزارش کنید.
- ✓ پیش از برداشتن دارو از یخچال دست‌ها را به خوبی با آب و صابون شسته و با حوله تمیز خشک کنید.
- ✓ بعد از خارج کردن دارو از یخچال مطمئن شوید که تاریخ مصرف آن نگذشته باشد.



✓ صبر کنید تا دمای دارو با دمای اطاق یکسان شود در این مدت دارو باید دور از هر نوع منبع نوری یا گرما باشد و حدود ۱۵-۳۰ دقیقه طول خواهد کشید.

✓ دارو نباید بیش از ۶۰ دقیقه در دمای اطاق نگه داشته شود.

✓ از گرم کردن دارو با استفاده از مالش شدید در میان کف دو دست، مایکروویو، فر معمولی، آب گرم خوداری نمایید.

✓ دارو معمولا باید شفاف و بدون رنگ باشد.

✓ با مشاهده کدورت یا رنگی شدن دارو و ذرات معلق و یا کف نباید از دارو استفاده کرد.

✓ در صورت خاموش شدن یخچال در اثر قطع برق یا خرابی و یخ زدن دارو و یا گرم شدن در حرارت بیش از ۲۵ درجه سانتی گراد از دارو استفاده نکنید.

❖ ونوفر

این دارو در کم خونی ناشی از کمبود آهن در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه که همودیالیز می شوند استفاده می شود. موارد زیر را در زمان استفاده از این دارو بخاطر بسپارید:

✓ ونوفر و آمپول ویتامین ث (C) با توجه به نیاز بیمار توسط پزشک حین دیالیز تزریق می شود.

✓ از مصرف خود سرانه دارو خودداری شود.

✓ مصرف بیش از حد دارو و یا سرعت بالای انفوزیون ممکن است باعث کاهش فشار خون، سردرد، تهوع، گیجی، درد مفاصل، بی حسی بدن، درد شکم، درد عضلات، ادم می گردد. در صورت بروز این نشانه ها به پرستار اطلاع دهید.

✓ این دارو با سایر داروها و یا محلول های تغذیه وریدی نباید مخلوط شود.

✓ در سالمندان به علت کاهش عملکرد قلب، سایر بیماری های زمینه ای و مصرف سایر داروها باید در انتخاب میزان مناسب دارو احتیاط شود.

❖ کربنات کلسیم

این دارو به همراه ویتامین D₃ جهت برقراری تعادل کلسیم و فسفر و پیشگیری از بروز عوارض استخوانی مانند درد، پوکی استخوان، تغییر استخوان و شکستگی خود بخودی استخوان ها استفاده می شود. از

کربنات کلسیم به منظور کاهش فسفر موجود در غذا و جلوگیری از جذب آن و از ویتامین دی فعال به منظور افزایش کلسیم و جذب آن از روده ها استفاده می شود.

موارد زیر را در زمان استفاده از این دارو بخاطر بسپارید:

✓ در صورت بروز علائم بی اشتهایی، تهوع، یبوست، دل درد، خشکی دهان یا احساس تشنگی با پزشک مشورت نمایید.

✓ دارو در دمای ۳۰-۱۵ درجه سانتی گراد و در پوشش بسته نگهداری شود.

✓ این قرص در ابتدا و یا بین غذا مصرف شود.

✓ از مصرف غذاهایی که دارای فسفر بیشتری هستند، خودداری نمایید. مواد غذایی حاوی فسفر عبارتند از پنیر، حبوبات، زرده تخم مرغ، جوانه گندم، نان های سبوس دار، کله پاچه، ماهی ها خصوصا ماهی سفید.

❖ ویتامین دی (D)

نوعی از ویتامین D₃ وجود دارد که در کلیه ها تولید می شود. این ویتامین موجب استحکام استخوان ها می گردد. در صورتی که کلیه ها کارایی خود را از دست بدهد و بیمار نیاز به دیالیز داشته باشد باید از طریق تزریقی این ویتامین را دریافت کنند.

✓ به صورت دوره ای و با نظر پزشک آزمایش کلسیم و فسفر را انجام دهید.

✓ دارو را دور از نور و حرارت نگهداری کنید.

❖ داروهای فشار خون و انسولین

عارضه اصلی افزایش فشار خون و دیابت، نارسایی کلیه ها می باشد.

✓ کلیه داروها باید طبق دستور و منظم مصرف شود.

✓ از قطع ناگهانی دارو پرهیز شود.

✓ اگر در حین دیالیز دچار افت فشار خون یا قند می شوید، فقط وعده دارویی قبل از دیالیز را مصرف نکنید.

❖ سایر داروها

این داروهای شامل ب کمپلکس، ویتامین ای (E) و اسید فولیک می باشد. مصرف اسید فولیک در بیماران مبتلا به نوعی کم خونی موجب تولید گلبول قرمز و خون سازی می شود. از آنجایی که ویتامین ب و

اسید فولیک، محلول در آب بوده و از طریق دیالیز آن ها را از دست می دهید لذا باید روزانه جبران و بصورت قرص مصرف نمایید.

❖ نکات کلی در مصرف داروها

✓ کلیه داروها، حتی داروهایی که پزشکان غیر دیالیز برای شما تجویز می کنند، باید با اطلاع پزشک نفرولوژیست شما باشد.

✓ از مصرف هرگونه مسکن به خصوص متوکاربامول و بکلوفن مگر با تجویز پزشک معالجتان خودداری فرمایید.

✓ مصرف سایر ویتامین ها، باید با نظر پزشک معالج باشد.

✓ داروها در ساعت مشخص مصرف شود.

✓ در صورتی که دارویی را فراموش نمودید و تا ساعت مصرف بعدی زمان زیادی دارید آن را مصرف کنید. ولی اگر به زمان مصرف بعدی نزدیک است از مصرف آن خودداری نمایید.

✓ داروها را دور از دسترس اطفال نگهداری کنید.

✓ قرص های تاریخ مصرف گذشته را در منزل نگه داری نکنید.

✓ همیشه به میزان کافی داروهای مصرفی را در منزل داشته باشید و پیش از تمام شدن آن، دوباره نسخه را از داروخانه تهیه نمایید یا به پزشک مراجعه نمایید.

✓ اگر قصد سفر دارید، حتما مطمئن شوید که دارو به میزان کافی برای آن مدت به همراه دارید.

✓ در صورت مراجعه به هر پزشک دیگری، حتما پزشک را از مصرف داروها مطلع نمایید.

✓ خودسرانه و بدون مشورت با پزشک خود، داروهای مصرفی خود را قطع و یا تغییر ندهید.

❖ در چه شرایطی به پزشک مراجعه نمایید؟

✓ در صورت مشاهده عوارض دارویی مانند بی اشتهایی، استفراغ، اسهال و...

✓ در صورت اتمام داروهای مصرفی و یا رسیدن زمان ویزیت