




✓ باکتری‌ها یا قارچ‌هایی که وارد خون می‌شوند، دریچه‌ها و پوشش داخلی قلب را در کسانی که قبلاً آسیب قلبی داشته‌اند عفونی می‌کنند. باکتری‌ها یا قارچ‌ها به دریچه‌ها، عضله و پوشش داخلی قلب آسیب وارد می‌آورند یا آسیبی که از قبل وجود داشته است را تشدید می‌کنند.

- ✓ عوامل تشدید کننده احتمال خطر
- ✓ تب روماتیسمی بیماری مادرزادی قلب
- ✓ وارد آمدن آسیب به دریچه‌های قلب
- ✓ تزریق مواد آلوده به داخل جریان خون (مثلاً همراه با تزریق وریدی مواد مخدر)
- ✓ سوء مصرف الکل
- ✓ وجود دریچه مصنوعی در قلب



❖ عوارض احتمالی

## ❖ شرح بیماری

آندوکاردیت عبارت است از یک التهاب غیر مسری که عضله قلب، دریچه‌های قلب و پوشش داخلی حفرات یا دریچه‌های قلب را درگیر می‌سازد.


## ❖ علائم

افرادی که به التهاب عضله قلب مبتلا می‌شوند علائم در آن‌ها به دو صورت دیر هنگام و زود هنگام به صورت زیر بروز می‌نمایند.

- علائم زودهنگام
- ✓ خستگی و ضعف
- ✓ تب، لرز و تعریق زیاد، خصوصاً در شب
- ✓ کاهش وزن
- ✓ دردهای مبهم
- ✓ وجود صدای غیر طبیعی در قلب
- علائم دیر هنگام
- ✓ لرز شدید و تب بالا
- ✓ تنگی نفس در هنگام فعالیت
- ✓ تورم پاها و شکم
- ✓ تند یا نامنظم شدن ضربان قلب

## ❖ علل شایع

عواملی که در ایجاد التهاب عضله قلب دخالت دارند شامل:



## التهاب لایه داخلی قلب (آندوکاردیت)

تهیه کننده: واحد آموزش سلامت

تایید کننده: کمیته آموزش بیمار

تاریخ بازنگری: پاییز ۱۴۰۲

منابع: ClinicalKey, WebMD, Mayo clinic



- ✓ تشکیل لخته‌های خونی که ممکن است به مغز، کلیه‌ها، یا احشای شکمی بروند و باعث بروز عفونت، آبسه یا سگته مغزی شوند.
- ✓ اختلالات ریتم قلب (شایع‌ترین آن فیبریلاسیون دهلیزی است).
- ✓ نارسایی قلب



## ❖ تشخیص

- ✓ تشخیص توسط پزشک با اخذ شرح حال و معاینه دقیق بیمار صورت می‌پذیرد. در صورت نیاز از دیگر روش‌های تشخیصی از جمله موارد زیر استفاده می‌شود:

- ✓ آزمایش خون
- ✓ عکس برداری از قفسه سینه
- ✓ اکوکاردیوگرام از طریق قفسه سینه
- ✓ اکوکاردیوگرام از طریق مری

## ❖ درمان

- ✓ این بیماری زود هنگام قابل معالجه است، اما بهبود ممکن است هفته‌ها طول بکشد. اگر درمان به تأخیر افتد، عملکرد قلب کاهش یافته و نارسایی احتقانی قلب رخ خواهد داد.
- ✓ در صورت عود بیماری جراحی پیشنهاد می‌شود در صورت نیاز در اندوکاردیت دریچه قلب تعویض می‌شود.

## ❖ داروها

- ✓ در صورت تجویز آسپرین و داروهای ضدالتهاب غیر استروئیدی، دارو را پس از غذا مصرف کنید.
- ✓ در صورت مصرف کورتیکواستروئیدها، از قطع خودسرانه دارو خودداری کنید و دارو را با معده خالی مصرف نکنید.
- ✓ آنتی‌بیوتیک طبق دستور پزشک در ساعت معین و یک دوره کامل مصرف نمایید.
- ✓ در کیف پول خود روی یک کارت فهرست آنتی‌بیوتیک‌های مورد نیاز برای مصرف پیش از کارهای دندانپزشکی و پزشکی را یادداشت کنید.



## ❖ در چه شرایطی به پزشک مراجعه نمایید؟

- ✓ در صورت بروز تب
- ✓ سرگیجه یا غش
- ✓ بی نظمی در ضربان قلب
- ✓ تنگی نفس یا درد قفسه سینه
- ✓ ضعف یا فلج ناگهانی در عضلات صورت، تنه یا اندام‌ها
- ✓ بروز علائم جدید

## “ارتباط با ما”

۰۳۵۳-۳۱۲۲۳۳۰

تلفن تماس:

۰۹۹۶۵۲۵۰۰۶۹

اینا:

rahnemoon.ssu.ac.ir

آدرس اینترنتی: