

ضربان تند قلب (حمله فوق بطنی)

تهیه کننده: واحد آموزش سلامت

تایید کننده: کمیته آموزش بیمار

تاریخ بازنگری: پاییز ۱۴۰۲

منابع: ClinicalKey, WebMD, Mayo clinic

❖ شرح بیماری

تاکی کاردی حمله‌ای فوق بطنی یا افزایش حمله‌ای ضربان قلب، به صورت احساس تپش قلب شدید و ناگهانی به صورت حمله‌ای بروز کرده و منجر به افزایش شدید ضربان قلب در حد ۱۳۰ تا ۱۸۰ ضربه در دقیقه و حتی گاهی بیشتر می شود. افراد مبتلا به این نوع ضربان‌ها معمولاً قلب و عروق سالم دارند و ایجاد این ضربان‌ها تنها مشکل آن‌هاست. البته همانند سایر افراد در معرض ابتلا به سایر بیماری‌های قلبی از جمله انسداد عروق کرونری و... هستند.

شروع حملات به صورت ناگهانی بوده و بعد از چند دقیقه تا چند ساعت به صورت خود به خود یا با درمان دارویی در بیمارستان به صورت ناگهانی قطع می‌شوند. تعداد این حملات متفاوت بوده و ممکن است از یک بار در سال یا چند بار در روز متغیر باشد.

❖ علائم

در صورتی که به تاکی کاردی حمله‌ای فوق بطنی مبتلا شوید علائم زیر در شما ایجاد می‌شود:

- ✓ شروع و ختم افزایش ضربان‌ها و حمله معمولاً ناگهانی است.
- ✓ تعداد ضربان بین ۱۳۰ تا ۱۸۰ بار در دقیقه یا بیشتر متغیر است.

✓ کاهش فشارخون

✓ تعریق

❖ علل شایع

مسیرهای فرعی معمولاً در سنین کودکی و جوانی و مسیرهای اضافی داخل گره دهلیزی بطنی که شروع کننده ضربان‌های قلبی هستند، معمولاً در سنین میانسالی منجر به حملات می‌شوند. گاهی در موارد نادر علت ایجاد بیماری ناشناخته است.

عوامل تشدید کننده بیماری عبارتند از:

- ✓ مصرف کافئین، تنباکو، الکل
- ✓ اختلالات دریچه‌ای و بیماری دریچه میترا
- ✓ بیماری روماتیسمی قلب
- ✓ بیماری انسدادی مزمن ریه
- ✓ سکته قلبی
- ✓ مسمومیت با دیگوکسین
- ✓ اضطراب و هیجان
- ✓ بزرگ شدن دهلیزها
- ✓ افزایش فشارخون



❖ عوارض احتمالی


ضربان تند قلب گاهی ممکن است نشان از وجود نوعی نقص در قلب باشد و این وضعیت در صورت عدم درمان می تواند مشکلات جدی مانند نارسایی قلب، انسداد عروق کرونر و ... را به همراه داشته باشد.

❖ تشخیص

پزشک معالج جهت تشخیص بیماری شما موارد زیر را انجام می دهد:

✓ نوار قلب

✓ تشخیص توسط خود بیمار با احساس تپش قلب



❖ درمان

پزشک معالج با توجه به شدت بیماری موارد زیر را به عنوان

درمان جهت بیمار به کار می برد:

✓ تحریک عصب واگ توسط پزشک

✓ درمان دارویی استفاده از داروهای وراپامیل وایندرال و

دیگوکسین و آدنوزین در بیمارستان توسط پزشک

✓ شوک درمانی در صورت عدم کنترل ضربان ها و با صلاح دید پزشک

✓ در بیمارانی که مکرر دچار این نوع ضربان ها می شوند عمل جراحی انجام می شود در این عمل جراحی مکانی از قلب که شروع کننده این نوع حملات هستند، سوزانده می شوند.

❖ در چه شرایطی به پزشک مراجعه نمایید؟

✓ تپش قلب

✓ کاهش فشار خون

✓ تنگی نفس

✓ سنکوپ (یا غش کردن)



“ارتباط با ما”

۰۳۵۳-۳۱۲۲۳۳۰

تلفن تماس:

۰۹۹۶۵۳۵۰۰۶۹

ایمیل:

rahnemoon.ssu.ac.ir

آدرس اینترنتی: